

Hep G2-RFP

示踪稳定细胞株

(CellCook cat: CC0101R)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 肝
- **疾病:** 肝母细胞瘤

规格及存储

常规出库:

 T25培养瓶, 1x10⁶cells

 活细胞请及时放置于细胞培养箱
 (37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

 同批次2管, 1x10⁶cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

MEM(CellCook cat: CM2015, 或同配方) 10%胎牛血清(CellCook cat: CM1002L, 或更高级别) 添加剂: 1X 非必需氨基酸(CellCook cat: CM1008S/L)

推荐培养试剂

基础培养基:

MEM(CellCook cat: CM2015, 或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat: CM1002L)

添加剂:

1X 非必需氨基酸(CellCook cat: CM1008S/L)

[配套完全培养基\(CellCook cat: CC0101RM\)](#)
传代比例: 1:4传代 (培养面积比)

传代方式: 消化5分钟

换液频率: 每周换液两次。

倍增时间: ~50-60 hours (DSMZ)

冻存液配方: MEM+10%FBS+1X 非必需氨基酸+10%DMSO

难度等级: +++

培养要点: 细胞有堆叠生长特性, 消化后需两天贴壁至完全摊开。

特征特性: 该细胞来源于一名15岁的白人少年的肝癌组织。该细胞表达甲胎蛋白、白蛋白、α-2-巨球蛋白、α-1-抗胰蛋白酶、转铁蛋白、α-1-抗凝乳蛋白酶、结合珠蛋白、铜蓝蛋白、纤溶酶原、补体C4、C3激活物、纤维蛋白原、α-1酸性糖蛋白、α-2-HS-糖蛋白、β-脂蛋白、视黄醇结合蛋白; 表达胰岛素受体和胰岛素样生长。

药筛: 通过慢病毒感染的方式将携带荧光的基因片段整合进细胞基因组, 使细胞表达荧光蛋白, 在荧光显微镜下可以进行观察, 标记后的细胞非常容易进行追踪检测。由于是用慢病毒转染的方式, 导致细胞荧光表达量的不确定性, 为增强细胞荧光表达量可进行抗性筛选。

荧光株培养条件与野生型细胞一致。正常培养过程中定期(一个月2-3次或频率自定)用终浓度4μg/mL的嘌呤霉素追加筛选, 冻存后复苏也建议可以追加筛选一次, 不需要培养过程中每天都加药。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
HepG2	X, Y	10, 11	9, 13	12	11, 12	10	9	8, 9	17