



产品信息

ZR-75-1

人乳腺导管癌细胞

(CellCook cat: CC0311)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 乳腺
- **疾病:** 浸润性导管癌

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方) 10%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC0311M\)](#)

传代比例: 1:3传代 (培养面积比)

传代方式: 消化2-3分钟

换液频率: 每周换液2-3次

倍增时间: 80 hours, at 40th passage (PubMed=688225), ~54 hours (PBCF).

冻存液配方: RPMI 1640+10%FBS+10%DMSO

难度等级: + + + +

培养要点: 细胞消化后需2天才能贴壁, 且生长缓慢, 90%汇合度即可传代

特征特性: 该细胞产生高水平的黏液素MUC-1 mRNA, 低水平的MUC-2 mRNA, 但不表达MUC-3基因; 表达雌激素受体。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
ZR-75-1	X	10,11	9	11	13	10,11	7,9,3	8	16,18