



产品信息

Ishikawa

人子宫内膜癌细胞

(CellCook cat: CC1103)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 子宫
- **疾病:** 子宫内膜腺癌

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方) 15%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC1103M\)](#)

传代比例: 1:3传代 (培养面积比)

传代方式: 消化2-3分钟

换液频率: 2~3天换液1次

倍增时间: 36 hours (at 9th passage), 29 hours (at 40th passage), 27 hours (at 50th passage)(DOI=10.1007/978-4-431-53981-0_2); 35.14 +- 2.68 hours (PubMed=23255909)

冻存液配方: RPMI 1640+15%FBS+10%DMSO

难度等级: +

培养要点: 暂无

特征特性: 原本认为该细胞来源于EnCA101细胞, 但后有文献报道该细胞实际为Ishikawa细胞。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
ECC-1(Ishikawa)	X	11, 12	9, 12	9	10, 11	9, 10	9, 10	8	14, 17