



产品信息

Su-DHL-6

人B细胞淋巴瘤细胞

(CellCook cat: CC1613)

- **形态特征:** 淋巴细胞样
- **生长特征:** 悬浮
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 淋巴
- **疾病:** 弥漫性大B细胞淋巴瘤(GCB型)

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(改良型)(CellCook cat:CM2006,或同配方) 10%澳洲胎牛血清(CellCook cat:CM1003L)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(改良型)(CellCook cat:CM2006,或同配方)

血清:

澳洲胎牛血清(CellCook cat:CM1003L)

添加剂:

\

配套完全培养基(CellCook cat:CC1613M)

传代比例: 1:3传代 (培养面积比)

传代方式: 离心收集(1000rpm,5分钟)

换液频率: 2~3天换液1次

倍增时间: \

冻存液配方: 90%澳洲胎牛血清+10%DMSO

难度等级: +++

培养要点: 需使用改良型1640培养基; 细胞静置培养一段时间之后会出现部分细胞贴壁的现象, 轻轻吹打即可脱落。

特征特性: DHL细胞系是从10位确诊患有弥漫性组织细胞淋巴瘤(DHL)的患者身上分离建系。该细胞源于一位43岁白人男性。EBV阴性。t(14;18)(q32;q21)的转位突变导致bcl-2基因被截短是导致该细胞发生发展的重要原因。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
Su-DHL-6	X	10	12,14	11,12	12	10	6,9,3	11,12	14,17