



产品信息

Renca(STR)

小鼠肾癌细胞

(CellCook cat: CC9013)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 小鼠源
- **组织来源:** 肾
- **疾病:** 肾癌

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co.,Ltd
- Tel:020-89449936
- Email:info@cellcook.com
- www.cellcook.com



培养条件

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方) 10%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别) 添加剂:1X 非必需氨基酸(CellCook cat:CM1008S/L)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

1X 非必需氨基酸(CellCook cat:CM1008S/L)

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC9013M\)](#)

传代比例: 1:3传代 (培养面积比)

传代方式: 消化2-3分钟

换液频率: 2~3天换液1次

倍增时间: \

冻存液配方: RPMI 1640+10%FBS+1X 非必需氨基酸+10%DMSO

难度等级: +

培养要点: 暂无

特征特性: Renca细胞是Balb/cCr小鼠自发形成的肾皮质腺癌中分离建系。细胞的生长特性与成人肾癌非常相似,尤其是自发的肺和肝转移。细胞不表达TGF- β 二型受体。

STR位点信息:

STR Locus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D18S11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D21S11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D5S1168	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D7S1987	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D13S17	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D16S1131	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D2S1328	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D3S1358	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D19S18	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D10S1248	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D12S1050	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D8S1179	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D17S12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D9S1628	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D14S645	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D6S1055	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D4S1393	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D15S10	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D11P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D12P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D17P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D19P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D21P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D22P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D23P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D24P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D25P1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25