

B16-F10(STR)

小鼠黑色素瘤细胞

(CellCook cat: CC9016)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 小鼠源
- **组织来源:** 皮肤
- **疾病:** 黑色素瘤

规格及存储

常规出库:

 T25培养瓶, 1×10^6 cells

 活细胞请及时放置于细胞培养箱
 (37°C , $5\%\text{CO}_2$)

冻存株出库:

 同批次2管, 1×10^6 cells/管

 接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方) 10%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC9016M\)](#)
传代比例: 1:4传代 (培养面积比)

传代方式: 消化2-3分钟

换液频率: 2~3天换液1次

倍增时间: 17 hours (PubMed=1109790); 17.2 hours (PubMed=23890195)

冻存液配方: RPMI 1640+10%FBS+10%DMSO

难度等级: ++

培养要点: 使用DMEM高糖培养基会使细胞大量产生黑色素

特征特性: 该细胞源于C57BL/6J小鼠黑色素瘤, 可以产生黑色素, 同基因小鼠体内移植可成瘤。

STR位点信息:

STR Profile	1-1	1-2	2-1	3-2	4-2	5-5	6-4	6-7	7-1
B16-F10	17,18,19	19,20	16	14	20,3,21,3	16,20	18,19	15	26,2
STR Profile	8-1	11-2	12-1	13-1	15-3	17-2	18-3	19-2	X-1
B16-F10	16,17	16	17,18	17,18	22,3,23,3	15,16,17	15,16	13,14	25,28