

C6

大鼠胶质瘤细胞 (CellCook cat: CC9101)

- 形态特征：多角
- 生长特征：贴壁
- 种属：大鼠源
- 组织来源：脑
- 疾病：胶质瘤

规格及存储

常规出库：

T25培养瓶， 1×10^6 cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库：

同批次2管， 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co.,Ltd
- Tel:020-89449936
- Email:info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

F-12K(CellCook cat:CM2004,或同配方) 15%马血清(CellCook cat:CM1001) 2.5%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别)

推荐培养试剂

基础培养基：

F-12K(CellCook cat:CM2004,或同配方)

血清：

马血清(CellCook cat:CM1001)，南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂：

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC9101M\)](#)

传代比例：1:2传代（培养面积比）

传代方式：消化2-3分钟

换液频率：2~3天换液1次

倍增时间：~24 hours (CLS)，~25-30 hours (DSMZ)

冻存液配方：F-12K+15%马血清+2.5%胎牛血清
+10%DMSO

难度等级：+

培养要点：暂无

特征特性：C6是由Benda等用N-亚硝基甲脒诱导的大鼠胶质瘤克隆，并经过一系列的体外培养和动物传代交替后建成的。该细胞表达S-100；产生生长激素；糖皮质激素作用下可以产生磷酸甘油脱氢酶。当细胞从低密度生长至回合状态时，S-100产量增加10倍。

STR位点信息：

